Dependencia e Independencia lineal

- * Combinación lineal
- * Dependencia lineal
- * Independencia lineal

DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA LINEAL

Recordemos que estamos "dentro" del tema Espacios Vectoriales.

Combinación lineal

Definición

Sea V un espacio vectorial y consideremos los vectores $v, v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. Decimos que v es combinación lineal de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tales que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = v$.

En este caso también se dice los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ generan al vector v .

Ejemplos:

En $\mathbb{R}^2$

El vector $(1,1)$ es combinación lineal de los vectores $(1,0)$ y $(0,1)$.

$$1(1,0) + 1(0,1) = (1,1)$$

El vector $(-2,10)$ es combinación lineal del vector $(1,-5)$.

Consideramos $\lambda_1 = -2$ y obtenemos

$$(-2, 10) = (-2)(1, -5)$$

Ejemplos →

Ejemplo 1

Sean v_1, v_2 y v_3 vectores tales que $v_1 + v_2 = v_3$.

¿Quié podemos decir de v_1, v_2 y v_3 ?

① Como $v_1 + v_2 = v_3$ es claro que v_3 es combinación lineal de v_1 y v_2 , con $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$.

Esto es lo mismo que decir que v_1 y v_2 generan a v_3

② ¿ v_2 es combinación lineal de v_1 y v_3 ?

Si, pues como estamos en un espacio vectorial v_1 tiene inverso aditivo $-v_1 = (-1)v_1$.

así $v_1 + v_2 = v_3$ implica $v_1 + v_2 + (-v_1) = v_3 + (-v_1)$ luego $v_2 = 1v_3 + (-1)v_1$

Ejemplo 2

Considera $V = \mathbb{R}^2$, $v_1 = (1, 0)$ y $v_2 = (0, 1)$. ¿Quié es el conjunto C generado por v_1 y v_2 ?

$$C = \{v \in \mathbb{R}^2 \mid v \text{ es combinación lineal de } (1, 0) \text{ y } (0, 1)\}$$

$$= \{ \lambda_1(1, 0) + \lambda_2(0, 1) \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ (\lambda_1, 0) + (0, \lambda_2) \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$= \{ (\lambda_1, \lambda_2) \mid \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \}$$

$$= \mathbb{R}^2$$

Ejemplo 3.

En $\mathbb{R}^3$ quié es el conjunto generado por:

a) $(0, 0, 0)$ el generado por $(0, 0, 0)$ está formado por todos los vectores de la forma $\lambda(0, 0, 0)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ pero $\lambda(0, 0, 0) = (0, 0, 0)$ para cualquier λ . Entonces el conjunto generado por $(0, 0, 0)$ es "el mismo" el vector $(0, 0, 0)$

b) $(0, 0, 1)$

el generado por $(0, 0, 1)$ está formado por todos los vectores de la forma $\lambda(0, 0, 1)$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ pero $\lambda(0, 0, 1) = (0, 0, \lambda)$ para cualquier λ . Entonces el conjunto generado por $(0, 0, 1)$ es el eje z .

Dependencia lineal

Definición

Sea V un espacio vectorial y consideremos los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. Decimos que los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ son linealmente dependientes si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ no todos cero tales que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$.

Ejemplos:

En $\mathbb{R}^2$

Los vectores $\underset{v_1}{(2,2)}$, $\underset{v_2}{(1,0)}$ y $\underset{v_3}{(0,1)}$ son linealmente dependientes.

Consideremos $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$. Entonces

$$(-1)(2,2) + 2(1,0) + 2(0,1) = (-2, -2) + (2,0) + (0,2) = (-2+2+0, -2+0+2) = (0,0)$$

Los vectores $(0,1)$ y $(1,0)$ no son linealmente dependientes.

$(0,1)$ y $(1,0)$

$$\lambda_1(0,1) + \lambda_2(1,0) = (0,0)$$

$$(\underline{0}, \underline{\lambda_1}) + (\underline{\lambda_2}, \underline{0}) = (\underline{0}, \underline{0})$$

$$(\underline{\lambda_2}, \underline{\lambda_1}) = (0,0) \quad \Rightarrow \quad \lambda_2 = 0 \quad \text{y} \quad \lambda_1 = 0$$

Independencia lineal

Definición

Sea V un espacio vectorial y consideremos los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$. Decimos que los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ son linealmente independientes si no son linealmente dependientes.

Es decir que la única manera de que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n = 0$ es cuando $\lambda_i = 0$ para toda i entre 1 y n .

Ejemplo:

$(0, 1)$ y $(1, 0)$

$$\lambda_1(0, 1) + \lambda_2(1, 0) = (0, 0)$$

$$(\underline{0}, \underline{\lambda_1}) + (\underline{\lambda_2}, \underline{0}) = (\underline{0}, \underline{0})$$

$$(\underline{\lambda_2}, \underline{\lambda_1}) = (\underline{0}, \underline{0}) \quad \Rightarrow \quad \underline{\lambda_2} = 0 \quad \text{y} \quad \underline{\lambda_1} = 0$$

Ejercicio 1

Dependencia e Independencia lineal

Considere los siguientes vectores en $\mathbb{R}^2$

$$V_1 = (3, 4), V_2 = (2, 1) \text{ y } V_3 = (0, 3)$$

¿Son linealmente dependientes o linealmente independientes?

$$\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0 \rightarrow$$

$$\lambda_1(3, 4) + \lambda_2(2, 1) + \lambda_3(0, 3) = (0, 0) \rightarrow$$

$$(3\lambda_1, 4\lambda_1) + (2\lambda_2, \lambda_2) + (0, 3\lambda_3) = (0, 0) \rightarrow$$

$$(3\lambda_1 + 2\lambda_2, 4\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3) = (0, 0) \rightarrow$$

$$\heartsuit \quad 3\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0$$

$\rightarrow$

$$\circ \quad 4\lambda_1 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$$

de $\heartsuit$ tengo $\lambda_1 = -\frac{2\lambda_2}{3}$. Sustituyendo en $\circ$ obtengo

$$4\left(-\frac{2\lambda_2}{3}\right) + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \rightarrow -\frac{8}{3}\lambda_2 + \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \rightarrow$$

$$-\frac{5}{3}\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \rightarrow 3\lambda_3 = \frac{5}{3}\lambda_2 \rightarrow \lambda_3 = \frac{\frac{5}{3}\lambda_2}{3} \rightarrow \lambda_3 = \frac{5}{9}\lambda_2$$

$$\lambda_1(3, 4) + \lambda_2(2, 1) + \lambda_3(0, 3) = (0, 0) \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \left(-\frac{2\lambda_2}{3}\right)(3, 4) + \lambda_2(2, 1) + \left(\frac{5}{9}\lambda_2\right)(0, 3) &= (-2\lambda_2, -\frac{8}{3}\lambda_2) + (2\lambda_2, \lambda_2) + (0, \frac{5}{3}\lambda_2) \\ &= (-2\lambda_2 + 2\lambda_2 + 0, -\frac{8}{3}\lambda_2 + \lambda_2 + \frac{5}{3}\lambda_2) \\ &= (0, 0) \end{aligned}$$

Para cualquier valor que le de a λ_2 si uso $\lambda_1 = -\frac{2\lambda_2}{3}$ y $\lambda_3 = \frac{5}{9}\lambda_2$ obtengo el vector $\vec{0}$ como combinación lineal.

Por lo tanto V_1, V_2 y V_3 son **linealmente dependientes**

Si queremos un ejemplo de $\lambda_1 V_1 + \lambda_2 V_2 + \lambda_3 V_3 = 0$ sólo hay que darle algún valor a λ_2

Notemos que $\lambda_2 = 0$ no funciona pues tendríamos $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

Intentemos con $\lambda_2 = 9$. Entonces $\lambda_1 = -\frac{2\lambda_2}{3} = -\frac{2(9)}{3} = -6$ y

$$\lambda_3 = \frac{5}{9}\lambda_2 = \frac{5}{9}(9) = 5.$$

Sustituimos "a ver si es cierto" LOL.

$$-6(3, 4) + 9(2, 1) + 5(0, 3) = (-18, -24) + (18, 9) + (0, 15) = (-18 + 18 + 0, -24 + 9 + 15) = (0, 0)$$

Más definiciones

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente dependiente* si algún elemento $\bar{v}$ de U es combinación lineal de los restantes, es decir, si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ y $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_r \in U$ tales que

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \dots + \lambda_r \bar{u}_r.$$

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente independiente* si ninguno de sus elementos es combinación lineal de los restantes, es decir, si no puede establecerse con ellos una combinación lineal igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Es decir, si una combinación lineal de elementos de U da lugar al vector nulo,

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \mu_2 \bar{u}_2 + \dots + \mu_s \bar{u}_s = \bar{0},$$

todos los coeficientes deben ser cero:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s = 0.$$

Más definiciones

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente dependiente* si algún elemento $\bar{v}$ de U es combinación lineal de los restantes, es decir, si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ y $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_r \in U$ tales que

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \dots + \lambda_r \bar{u}_r.$$

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente independiente* si ninguno de sus elementos es combinación lineal de los restantes, es decir, si no puede establecerse con ellos una combinación lineal igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Es decir, si una combinación lineal de elementos de U da lugar al vector nulo,

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \mu_2 \bar{u}_2 + \dots + \mu_s \bar{u}_s = \bar{0},$$

todos los coeficientes deben ser cero:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s = 0.$$

Más definiciones

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente dependiente* si algún elemento $\bar{v}$ de U es combinación lineal de los restantes, es decir, si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ y $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_r \in U$ tales que

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \dots + \lambda_r \bar{u}_r.$$

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente independiente* si ninguno de sus elementos es combinación lineal de los restantes, es decir, si no puede establecerse con ellos una combinación lineal igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Es decir, si una combinación lineal de elementos de U da lugar al vector nulo,

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \mu_2 \bar{u}_2 + \dots + \mu_s \bar{u}_s = \bar{0},$$

todos los coeficientes deben ser cero:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s = 0.$$

Más definiciones

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente dependiente* si algún elemento $\bar{v}$ de U es combinación lineal de los restantes, es decir, si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ y $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_r \in U$ tales que

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \dots + \lambda_r \bar{u}_r.$$

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente independiente* si ninguno de sus elementos es combinación lineal de los restantes, es decir, si no puede establecerse con ellos una combinación lineal igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Es decir, si una combinación lineal de elementos de U da lugar al vector nulo,

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \mu_2 \bar{u}_2 + \dots + \mu_s \bar{u}_s = \bar{0},$$

todos los coeficientes deben ser cero:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s = 0.$$

Más definiciones

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente dependiente* si algún elemento $\bar{v}$ de U es combinación lineal de los restantes, es decir, si existen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}$ y $\bar{u}_1, \bar{u}_2, \dots, \bar{u}_r \in U$ tales que

$$\bar{v} = \lambda_1 \bar{u}_1 + \dots + \lambda_r \bar{u}_r.$$

Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es *linealmente independiente* si ninguno de sus elementos es combinación lineal de los restantes, es decir, si no puede establecerse con ellos una combinación lineal igual al vector nulo y con al menos un coeficiente no cero. Es decir, si una combinación lineal de elementos de U da lugar al vector nulo,

$$\mu_1 \bar{u}_1 + \mu_2 \bar{u}_2 + \dots + \mu_s \bar{u}_s = \bar{0},$$

todos los coeficientes deben ser cero:

$$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_s = 0.$$

✚ Imágenes creadas con Bitmoji

✚ Notas hechas por Arilín Haro, de Arilín's Math World